

Состав растворов для перитонеального диализа «РАСТВОР ПД 2 С ГЛЮКОЗОЙ» РУ ЛП-008835, производство ЗАО «РЕСТЕР», Российская Федерация*

Действующие вещества	1,5%	2,3%	4,25%
Натрия хлорид	5,786 г	5,786 г	5,786 г
Декстрозы моногидрат)	16,5 г	25,0 г	46,75 г
(в пересчете на декстрозу безводную)	(15,0 г)	(22,73 г)	(42,5 г)
Кальция хлорида гексагидрат	0,3835 г	0,3835 г	0,3835 г
Натрия лактата 50%-ный раствор	7,850 г	7,850 г	7,850 г
(в пересчете на натрия лактат)	(3,925 г)	(3,925 г)	(3,925 г)
Магния хлорида гексагидрат	0,1017 г	0,1017 г	0,1017 г
Вспомогательное вещество			
Вода для инъекций	до 1 л	до 1 л	до 1 л

Ионный состав	1,5%	2,3%	4,25%
Натрий	134 ммоль/л	134 ммоль/л	134 ммоль/л
Кальций	1,75 ммоль/л	1,75 ммоль/л	1,75 ммоль/л
Магний	0,5 ммоль/л	0,5 ммоль/л	0,5 ммоль/л
Хлорид	103,5 ммоль/л	103,5 ммоль/л	103,5 ммоль/л
Лактат	35,0 ммоль/л	35,0 ммоль/л	35,0 ммоль/л
Глюкоза	83,2 ммоль/л	126,1 ммоль/л	235,8 ммоль/л
pH	5,0-6,0	5,0-6,0	5,0-6,0
Теоретическая осмолярность	358 мОсм/л	401 мОсм/л	511 мОсм/л

*Обязательно ознакомьтесь с полным текстом инструкции по применению лекарственного препарата «РАСТВОР ПД 2 С ГЛЮКОЗОЙ»